

Medicamentos contendo Piretróides para Espécies Pecuárias

NOME	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	INDICAÇÕES	ESPÉCIES	INTERVALO DE SEGURANÇA	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	Nº DA AIM	TITULAR AIM
Arpon 10%, solução para aplicação tópica em bovinos e equinos	Cipermetrina 10 g	O medicamento veterinário é um ectoparasiticida activo contra: - Bovinos e equinos: Moscas (Haematobia irritans, Musca autumnalis, Hydrotaea irritans) - Bovinos: Piolhos (Lignonatus spp, Haematopinus spp)	Bovinos e equinos	Bovinos – carne e vísceras: 2 dias - leite: 7 dias Não administrar a equinos destinados ao consumo humano	Solução para aplicação tópica	O medicamento veterinário apresenta-se em caixas de cartão com embalagens de 100 ml, 12 x 100 ml, 250 ml, 1 l. O medicamento veterinário apresenta-se em embalagens de 5 l. Embalagem de plástico coextrusionado com multicapa de cor branca, fechado com uma cápsula plástica de cor amarela e tampa dosificadora.	401/01/11NFV PT	UNIVETE, S. A.
BAYOFLY - POUR-ON	CIFLUTRINA 1% p/p	CONTRA INFESTAÇÕES POR MOSCAS E TABANÍDEOS EM GADO BOVINO MANTIDO EM PASTAGENS, INCLUINDO VACAS LEITEIRAS EM PRODUÇÃO	BOVINOS	ZERO DIAS	SOLUÇÃO A 1% PARA APLICAÇÃO POUR-ON	EMBALAGENS DE 250ml E 500ml	51314	BAYER PORTUGAL, SA
BUTOX 7,5 Pour On, solução para unção contínua para Bovinos e Ovinos	Deltametrina 7,50mg	Para controlo de Moscas (Haematobia irritans, Hippobosca equina, Musca domestica) em bovinos, Piolhos em bovinos e ovinos (Linognatus vituli, L. ovillus e Haematopinus eurystenus), incluindo os malófagos (Damalinia ovis e D. bovis) e Carraças em bovinos (Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus bursa e R. sanguineus). Uma única aplicação assegura uma proteção eficaz nos animais durante 2 meses contra moscas e piolhos, incluindo os malófagos, e durante 2 a 5 semanas contra carraças em bovinos.	Bovinos e Ovinos	Bovinos: Dose: até 30 ml/animal (controlo de mosca e piolhos incluindo os malófagos) Carne e vísceras: 18 dias Leite: Zero dias Dose: 75 ml/animal (controlo da carraça) Carne e vísceras: 18 dias Leite: 12 horas Ovinos: Carne e vísceras: 2 dias Leite: 12 horas	Solução para unção contínua	Frasco em polietileno de 250 ml e 1 litro e frasco de 2,5 litros. O aplicador encontra-se no interior do frasco de 250 ml e 1 litro e fixo ao frasco de 2,5 litros. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.	452/01/12NFV PT	MSD Animal Health Lda.

NOME	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	INDICAÇÕES	ESPÉCIES	INTERVALO DE SEGURANÇA	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	Nº DA AIM	TITULAR AIM
CIPER-PULVIZOO 100MG/ML SOLUÇÃO TÓPICA PARA BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E EQUINOS	Cipermetrina (40:60) 100 mg	O medicamento veterinário é um ectoparasiticida activo contra: - Bovinos e equinos: Moscas (Haematobia irritans, Musca automnalis, Hydrotaea irritans e Musca domestica) - Bovinos: Piolhos (Lignonatus spp, Haemotopinus spp) - Ovinos: Sarna (Psoroptes ovis e Sarcoptes scabiei) e piolhos (Damalinia ovis). - Caprinos: moscas (Haematobia irritans, Musca automnalis, Hydrotaea irritans), piolhos (Lignonatus spp, Haemotopinus spp) e Carraças (Hyalomma a. anatolicum; Rhipicephalus sanguineus).	Bovinos, Caprinos, Ovinos e Equinos.	Bovinos: carne e vísceras: 2 dias Ovinos: carne e vísceras: 8 dias Caprinos: carne e vísceras: 10 dias Bovinos, ovinos e caprinos: leite: 7 dias Não administrar a equinos destinados ao consumo humano	Solução Tópica	Embalagem de polietileno de alta densidade de 250 ml de capacidade, opaca em coextrusão. Embalagem de polietileno de alta densidade de 1000 ml de capacidade, opaca em coextrusão. Embalagem de polietileno de alta densidade 100 ml, opaca em coextrusão. Tampa de polietileno de cor vermelha de alta densidade com disco soldável.	539/01/12NFV PT	CALIER PORTUGAL, S.A
Coopertix 2% Pour-On, solução para unção contínua em bovinos	Cialotrina 2,0 0%	Ectoparasiticida para o controlo de piolhos (Damalinia bovis, Linognathus vituli, Haematopinus eurytenuis e Solenopotes capillatus) e moscas (Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Haematobosca stimulans, Musca autumnalis, Hydrotaea irritans, Hydrotaea albipuncta, Haematopota pluvialis, Haematopota italica, Morellia simplex e Stomoxys calcitrans) em bovinos.	Bovinos.	Bovinos Carne e vísceras: 14 dias Leite: 3 dias	Solução para unção contínua	Frasco de plástico (especificar o material da embalagem) doseador de 1000 ml.	471/01/12NFV PT	Laboratório s Pfizer, Lda.

NOME	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	INDICAÇÕES	ESPÉCIES	INTERVALO DE SEGURANÇA	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	Nº DA AIM	TITULAR AIM
Deltanil 10 mg/ml Solução Para Unção Contínua para bovinos e ovinos	Deltametrina 10 mg	<p>Aplicação tópica para o tratamento e prevenção das infestações por piolhos e moscas em bovinos, carraças, piolhos e miíases em ovinos, piolhos e carraças em borregos.</p> <p>Bovinos: Tratamento e prevenção das infestações por piolhos mastigadores e sugadores incluindo <i>Bovicola bovis</i>, <i>Solenopotes capillatus</i>, <i>Linognathus vituli</i> e <i>Haematopinus eurysternus</i>. Como auxílio no tratamento e prevenção das infestações por moscas picadoras e por dípteros hematófagos incluindo <i>Haematobia irritans</i>, <i>Stomoxys calcitrans</i>, espécies de <i>Musca</i> e <i>Hydrotaea irritans</i>.</p> <p>Ovinos: Tratamento e prevenção das infestações por carraças <i>Ixodes ricinus</i> e por piolhos (<i>Linognathus ovillus</i>, <i>Bovicola ovis</i>), dípteros (<i>Melophagus ovinus</i>) e miíases (geralmente <i>Lucilia spp.</i>).</p> <p>Borregos: Controlo das infestações por carraças <i>Ixodes ricinus</i> e piolhos <i>Bovicola ovis</i>.</p>	Bovinos e ovinos.	<p>Bovinos: Carne e vísceras: 17 dias Leite: zero horas</p> <p>Ovinos: Carne e vísceras: 35 dias Leite. zero horas</p>	Solução para Unção Contínua	<p>Frasco branco de polietileno de alta densidade de 500 ml e 1 litro com selo de alumínio amovível, tampa HDPE e um dispositivo doseador PP equipado com uma câmara medidora para doses de 2,5ml, 5ml e 10ml, numa caixa de cartão.</p> <p>Frasco branco de polietileno de alta densidade de 2,5 litros, com selo de alumínio amovível, tampa PP e tampa de acoplamento PP ventilada.</p> <p>Bolsas flexíveis (Flexibag) de camadas múltiplas PET/alumínio/PA/PE de 2,5 litros ou de 4,5 litros, com tampa PP com acoplamento específico POM "E-lock", em caixa de cartão. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.</p>	736/01/13DFV PT	VIRBAC
Ectofly 12,5 mg/ml Solução para unção cutânea para ovinos	Cipermetrina Elevada: Cis (80:20) 12,5 mg	No tratamento e controlo das moscas além do tratamento de carraças e piolhos mordedores em ovinos. Na prevenção e tratamento de infestações por miíases em ovinos.	Ovinos	<p>Carne e vísceras: 8 dias. Leite: Não deve ser administrado a animais produtores de leite para consumo humano, nem a ovelhas leiteiras nas 2 semanas que antecedem o parto.</p>	Solução para unção contínua	<p>Embalagens de fundo plano em polietileno de alta densidade branco com fecho em polipropileno e enchimento selado a quente por indução, em tamanhos de embalagem de 1 litro, 2,5 litros e 5 litros.</p> <p>É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.</p>	473/01/12RFVP T	Cross Vetpharm Group Ltd.

NOME	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	INDICAÇÕES	ESPÉCIES	INTERVALO DE SEGURANÇA	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	Nº DA AIM	TITULAR AIM
Insecinor 10 mg/ml Solução para Unção Punctiforme para bovinos e ovinos	Deltametrina 10 mg	Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por piolhos e moscas em bovinos; carraças piolhos, melófagos e miíases cutâneas estabelecidas em ovinos, e piolhos e carraças em borregos. Em bovinos: Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por piolhos mordedores e sugadores, incluindo <i>Bovicola bovis</i> , <i>Solenopotes capillatus</i> , <i>Linognathus vituli</i> e <i>Haematopinus eurytarnus</i> em bovinos de carne e bovinos de leite. Também como auxiliar no tratamento e prevenção de infestações de moscas picadoras e moscas de um modo geral, incluindo <i>Haematobia irritans</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , espécies <i>Musca</i> e <i>Hydrotaea irritans</i> . Em ovinos: Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por carraças <i>Ixodes ricinus</i> e por piolhos (<i>Linognathus ovillus</i> , <i>Bovicola ovis</i>), melófagos (<i>Melophagus ovinus</i>) e miíases cutâneas estabelecidas (geralmente <i>Lucilia spp.</i>). Em borregos: Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por carraças <i>Ixodes ricinus</i> e por piolhos <i>Bovicola ovis</i> .	Bovinos e ovinos.	Bovinos: Carne e vísceras: 17 dias Leite: zero horas Ovinos: Carne e vísceras: 35 dias Leite: Não é autorizada a administração a ovelhas produtoras de leite destinado ao consumo humano.	Solução para Unção Contínua.	Frasco de 250 e 500 ml de polietileno de alta densidade com câmara interna graduada de calibração, e tampa de rosca branca de polipropileno. Mochila de 1 litro e 2,5 litros, branca, de polietileno de alta densidade, para utilização com um dispositivo de dosagem adequado, e com uma tampa de rosca branca de polipropileno. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.	819/01/14DFV PT	Norbrook Laboratories Ltd,

NOME	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	INDICAÇÕES	ESPÉCIES	INTERVALO DE SEGURANÇA	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	Nº DA AIM	TITULAR AIM
PERMUTANOL 10% Solução emulsão cutânea para bovinos, equinos, ovinos e caprinos	Cipermetrina 10g	O medicamento veterinário é um ectoparasiticida activo contra: Bovinos e equinos: moscas (Haematobia irritans, Musca autumnalis, Hydrotaea irritans), carraças , ácaros da sarna (Dermatophagus gallinae), piolhos (Lignonatus spp, Haematopinus spp) Ovinos e caprinos – ácaros da sarna (Dermatophagus gallinae), piolhos (Lignonatus spp, Haematopinus spp)	Bovinos, equinos, ovinos e caprinos	Bovinos: carne e vísceras: 2 dias Ovinos: carne e vísceras: 8 dias Caprinos: carne e vísceras: 10 dias Bovinos, ovinos e caprinos: leite: 7 dias Não administrar a equinos destinados ao consumo humano	Solução emulsionável	Embalagem de 100 ml, opaca em coextrusão (poliamida + HDP). Embalagem de 250 ml, opaca em coextrusão (poliamida + HDP) de 60 g. Embalagem de 1000 ml, opaco em coextrusão (poliamida + HDP) com peso de 100g. Cápsula de alumínio anodizada com disco de porex interior e esmalte branco exterior.	522/01/12NFV PT	Vet Permutador a

NOME	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS	INDICAÇÕES	ESPÉCIES	INTERVALO DE SEGURANÇA	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	Nº DA AIM	TITULAR AIM
Spotinor 10 mg/ml Solução para Unção Punctiforme para bovinos e ovinos	Deltametrina 10 mg	Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por piolhos e moscas em bovinos; carraças piolhos, melófagos e miíases cutâneas estabelecidas em ovinos, e piolhos e carraças em borregos. Em bovinos: Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por piolhos mordedores e sugadores, incluindo <i>Bovicola bovis</i> , <i>Solenopotes capillatus</i> , <i>Linognathus vituli</i> e <i>Haematopinus eurytarnus</i> em bovinos de carne e bovinos de leite. Também como auxiliar no tratamento e prevenção de infestações de moscas picadoras e moscas de um modo geral, incluindo <i>Haematobia irritans</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , espécies <i>Musca</i> e <i>Hydrotaea irritans</i> . Em ovinos: Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por carraças <i>Ixodes ricinus</i> e por piolhos (<i>Linognathus ovillus</i> , <i>Bovicola ovis</i>), melófagos (<i>Melophagus ovinus</i>) e miíases cutâneas estabelecidas (geralmente <i>Lucilia spp.</i>). Em borregos: Para o tratamento e prevenção de infestações causadas por carraças <i>Ixodes ricinus</i> e por piolhos <i>Bovicola ovis</i> .	Bovinos e ovinos.	Bovinos: Carne e vísceras: 17 dias Leite: zero horas Ovinos: Carne e vísceras: 35 dias Leite: Não é autorizada a administração a ovelhas produtoras de leite destinado ao consumo humano.	Solução para unção Contínua.	Frasco de 250 e 500 ml de polietileno de alta densidade com câmara interna graduada de calibração, e tampa de rosca branca de polipropileno. Mochila de 1 litro e 2,5 litros, branca, de polietileno de alta densidade, para utilização com um dispositivo de dosagem adequado, e com uma tampa de rosca branca de polipropileno. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.	818/01/14DFV PT	Norbrook Laboratories Ltd,