

# Planos de Contingência



*Febre Aftosa, Peste Bovina, Febre do Vale do Rift, Dermatose Nodular Contagiosa, Peripneumonia Contagiosa Bovina, Variola Ovina e Caprina, Peste dos Pequenos Ruminantes, Peripneumonia Contagiosa Caprina, Peste Equina, Mormo, Peste Suína Africana, Peste Suína Clássica, Gripe Aviária e Doença de Newcastle*

## Protocolo de Biossegurança do Pessoal para a Entrada na Exploração



## 1 Preparação do Material

- Preparar o material e o equipamento de proteção individual (EPI) antes da visita
  - Usar a checklist para o material e EPI



## 2 Preparação da Viatura


- Preparar uma zona limpa e uma zona suja na viatura
  - Forrar a zona suja com um plástico



### 3 Entrada na Exploração

- Remover todos os objetos (relógios, anéis, carteiras, etc)
  - Se levar o telemóvel colocar dentro de um saco hermeticamente fechado (zip-lock)

#### Barreira de biossegurança com ponto de limpeza e desinfecção



## **Esquema do circuito da entrada do pessoal da exploração**



## 4 Preparação do Ponto de Limpeza e Desinfecção

- À chegada à exploração estabelecer um ponto de limpeza e desinfecção à entrada da exploração
  - Preparar uma zona suja e uma limpa para equipar e desequipar o pessoal que entra e sai da exploração de acordo com o esquema acima
  - Colocar no plástico todo o material e EPI necessários na zona limpa



## 5 Colocação do EPI

- Retirar os sapatos
  - Vestir o 1.º fato de macaco (interior)
  - Colocar a touca ou capuz do fato interior
  - Colocar as botas de borracha - fato dentro da bota
  - Colocar a máscara com o elástico por cima do capuz/touca (Gripe Aviária)
  - Colocar os óculos (Gripe Aviária)



## 6 Colocação do EPI

- Colocar o 1.º par de luvas
  - Fixar com fita-cola nos punhos por cima do fato interior



## 7 Colocação do EPI

- Vestir o 2.º fato de macaco com o fato fora das botas de borracha
  - Colocar os sobre-botas
  - Colocar o 2.º par de luvas por cima do punho do fato exterior. Não colocar fita cola para permitir mudança de luvas na visita




# Planos de Contingência



Febre Aftosa, Peste Bovina, Febre do Vale do Rift, Dermatose Nodular Contagiosa, Peripneumonia Contagiosa Bovina, Variola Ovina e Caprina, Peste dos Pequenos Ruminantes, Peripneumonia Contagiosa Caprina, Peste Equina, Mormo, Peste Suína Africana, Peste Suína Clássica, Gripe Aviária e Doença de Newcastle

## Protocolo de Biossegurança do Pessoal para a **Saída** na Exploração



### 1 Desinfecção Geral

- Desinfetar o EPI e o revestimento do saco da amostra, dos formulários e outro material não descartável
- Colocar o saco das amostras e restante material na zona limpa da barreira dentro de um saco



### 2 Remoção do EPI

#### Primeiro ponto de lavagem e desinfecção

- Retirar os cobre-botas e desinfetar as luvas
- Retirar o 1º par de luvas, tocando apenas no seu exterior
- Colocar no saco do lixo e deixar na exploração para eliminação



### 3 Remoção do EPI

#### Primeiro ponto de lavagem e desinfecção

- Retirar os óculos (Gripe Aviária)
- Retirar o fato exterior
- Não tocar no interior do fato exterior, puxando pelos ombros e mangas
- Embrulhar o fato e restante material pelo interior
- Colocar no saco do lixo e deixar na exploração para eliminação



### 4 Remoção do EPI

#### Segundo ponto de lavagem e desinfecção

- Lavar as botas retirando toda a sujidade usando escova.
- Desinfetar as botas
- Retirar a máscara (Gripe Aviária) e puxar para trás o capuz/touca
- Retirar a fita cola das luvas
- Retirar o fato interior conjuntamente com o 2º par de luvas e as botas
- Ao retirar não tocar no interior do fato com as luvas
- Colocar no saco do lixo e deixar na exploração para eliminação



### 5 Remoção do Restante Material

#### Na zona limpa

- Calçar os sapatos
- Desinfetar os baldes pelo exterior
- Desinfetar as mãos e a cara com toalhetes
- Desinfetar o plástico da barreira e restante equipamento e material
- Colocar tudo em sacos de plástico e levar para a zona suja do carro conjuntamente com as amostras