

## **Anexo II**

### **TERAPÊUTICA DA INTOXICAÇÃO POR PIRETRÓIDES NO GATO \***

#### **1-Lavar com um detergente suave**

#### **2-Em caso de convulsões após a aplicação:**

Diazepam 0,2 - 2,0 mg/kg I.V.<sup>1</sup>

ou

Metocarbamol 55-220 mg/kg I.V.<sup>1</sup> (débito máx. 200 mg/min.)

Na ausência de resultados:

Fenobarbital 6 mg/kg I.V., em injeção lenta<sup>1</sup>

ou

Pentobarbital 4-20 mg/kg I.V.<sup>1</sup>, em injeção lenta<sup>1</sup>

#### **3-Em caso de ingestão de piretróides**

Carvão activado 2 g/kg<sup>1</sup>

ou

Sulfato de magnésio (0,5-1 g/kg numa solução a 6% P.O. (sonda gástrica))<sup>2</sup>

ou

Sulfato de sódio (0,5-1 g/kg numa solução a 4 % P.O. (sonda gástrica))<sup>2</sup>.

#### **4-Em caso de hipersialia:**

Atropina 0,1 mg/kg I.V.. Repetir em caso de persistência<sup>2</sup>.

#### **5-Em caso de vômito ou diarreia**

Correcção e manutenção do equilíbrio hidro-electrolítico e ácido-base.

Monitorização e manutenção da temperatura corporal.

Protecção hepática com gluconato de cálcio (2-10 ml I.V.)<sup>1</sup>.

Vitaminas do Complexo B por via I.M.<sup>1</sup>.

Fontes:

<sup>1</sup> [www.vetpharm.uzh.ch](http://www.vetpharm.uzh.ch);

<sup>2</sup> MemoVet (Autor W. Kraft): "Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei Hund und Katze"

Editora: Schattauer GmbH, 4. Edição: 2005

\* Cortesia de Schering-Plough II – Veterinária, Lda.