

PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE AUJESZKY (PCEDA) VACINAS AUTORIZADAS PARA A DOENÇA DE AUJESZKY DECRETO-LEI N.º 85/2012 de 5 de abril alterado pelo DECRETO-LEI N.º 222/2012 de 15 outubro

NOME	Nº DA AIM	TITULAR AIM	INDICAÇÕES	ESPECIES	TIPO DE VACINA	FORMA FARMACÊUTICA	COMPOSIÇÃO
AD-LIVE SUIVAX	R697/02 DGV	FATRO, S.P.A - ITÁLIA	<p>PARA A IMUNIZAÇÃO ACTIVA DE SUÍNOS DE ENGORDA PARA PREVENÇÃO DA MORTALIDADE E SINAIS CLÍNICOS DA DOENÇA DE AUJESZKY E PARA REDUÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DA DOENÇA DE AUJESZKY.</p> <p>A PROTECÇÃO ESTÁ COMPLETA PELO MENOS 3 - 4 SEMANAS APÓS UMA ÚNICA VACINAÇÃO, E DURA PELO MENOS 6 MESES QUANDO É CUMPRIDO O PROGRAMA SUGERIDO DE VACINAÇÃO.</p>	SUÍNOS DE ENGORDA.	VIVA C/ EXCIPIENTE AQUOSO	PASTILHA LIOFILIZADA E SOLVENTE PARA SUSPENSÃO INJECTÁVEL	<p>SUBSTÂNCIAS ACTIVAS: VÍRUS ATENUADO E DELETADO DA DOENÇA DE AUJESZKY, ESTIRPE LOMBART, GE-(=GI): MIN. 105,5 DICT50, MAX. 106,5 DICT50 *DOSE INFECCIOSA EM CULTURA DE TECIDOS</p> <p>EXCIPIENTES: SACAROSE FOSFATO MONOPOTÁSSICO FOSFATO DIPOTÁSSICO GLUTAMATO SÓDICO LACTOSE PEPTONA CLORETO DE SÓDIO CLORETO DE POTÁSSIO FOSFATO DISSÓDICO ÁGUA PARA INJECTAVEIS</p>
AKIPOR 6.3 (EXCIPIENTE OLEOSO)	587/97 DGV	MERIAL PORTUGUESA - SAÚDE ANIMAL, LDA	DOENÇA DE AUJESZKY (ESTIRPE BARTHA, DELETADA GE-)	SUINOS	VIVA C/ EXCIPIENTE OLEOSO	LIOFILIZADO E SOLVENTE PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	<p>SUBSTÂNCIAS ACTIVAS: VÍRUS VIVO MODIFICADO DA DOENÇA DE AUJESZKY, ESTIRPE BARTHA, DELECTADA GE, TÍTULO GARANTIDO 106,3 DICC50</p> <p>ADJUVANTE (S): MERCURIOTIOLATO SÓDICO ≤ 0,2 MG</p> <p>EXCIPIENTE OLEOSO Q.B.P. 2 ML</p>
AUSKIPRA GN	581/97 DGV	LABORATÓRIOS HIPRA, S.A.	<p>IMUNIZAÇÃO ACTIVA CONTRA DOENÇA DE AUJESZKY EM SUÍNOS E IMUNIZAÇÃO PASSIVA DOS LEITÕES NASCIDOS DE PORCAS VACINADAS PARA PREVENIR A MORTALIDADE E OS SINAIS CLÍNICOS ASSIM COMO PARA REDUZIR A REPLICAÇÃO DO VÍRUS DA DOENÇA DE AUJESZKY.</p> <p>A PROTEÇÃO EM ANIMAIS SÃO APARECE ÀS 48 HORAS APÓS A VACINAÇÃO, AINDA QUE OS NÍVEIS ÓTIMOS</p> <p>IMUNITÁRIOS NÃO SE DETETEM ATÉ</p>	SUÍNOS. CATEGORIAS: PORCOS DE ENGORDA E REPRODUTORAS.	VIVA C/ EXCIPIENTE AQUOSO	SUSPENSÃO APÓS RECONSTITUIÇÃO DO LIOFILIZADO NO COMPONENTE LÍQUIDO APROPRIADO	<p>SUBSTÂNCIAS ACTIVAS: VÍRUS DA DOENÇA DE AUJESZKY, ESTIRPE BARTHA K 61 GI NEGATIVA ≥ 105,5 DICT50</p> <p>ADJUVANTE: LEVAMISOL CLOROHIDRATADO 1,8 MG</p> <p>EXCIPIENTES: METILPARABEN 2,4 MG</p>

PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE AUJESZKY (PCEDA) VACINAS AUTORIZADAS PARA A DOENÇA DE AUJESZKY DECRETO-LEI N.º 85/2012 de 5 de abril alterado pelo DECRETO-LEI N.º 222/2012 de 15 outubro

NOME	Nº DA AIM	TITULAR AIM	INDICAÇÕES	ESPECIES	TIPO DE VACINA	FORMA FARMACÊUTICA	COMPOSIÇÃO
			AOS 7 DIAS APÓS A VACINAÇÃO, ESTA PROTEÇÃO MANTÉM-SE ATÉ PELO MENOS 4 MESES DEPOIS DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA VACINAL RECOMENDADO.				
PARVOSUIN-MR/AD EMULSÃO INJECTÁVEL PARA SUÍNOS	634/99 DGV	LABORATÓRIOS HIPRA, S.A, ESPANHA/ARBUSET	IMUNIZAÇÃO ACTIVA DE SUÍNOS CONTRA A DOENÇA DE AUJESZKY, PARVOVIROSE SUÍNA E MAL RUBRO. O INÍCIO DA IMUNIDADE TEM LUGAR 3 SEMANAS DEPOIS DA VACINAÇÃO E A SUA DURAÇÃO É DE 1 ANO APÓS A VACINAÇÃO.	ESPÉCIE: SUÍNOS (PORCAS E VARRASCOS FUTUROS REPRODUTORES).	INACTIVADA C/ADJUVANTE OLEOSO	EMULSÃO INJECTÁVEL HOMOGÉNIA BRANCA OU ROSADA.	SUBSTÂNCIAS ACTIVAS: VÍRUS AUJESZKY INACTIVADO, ESTIRPE GI NEGATIVA, BARTHA K 61 ≥ 107,5 DICT50 PARVOVÍRUS PORCINO INACTIVADO, ESTIRPE NADL - 2. ≥ 2048 UHA <i>ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE</i> INACTIVADO, ESTIRPE R32E11, SEROVAR 2 ≥ 2 X 1010 UFC * *(CORRESPONDENTE A UMA RESPOSTA SEROLÓGICA EM RATOS (IRPC) ≥ 37,1) DICT50: DOSE INFECCIOSA EM CULTURA DE TECIDOS 50% UHA: UNIDADES DE HEMAGLUTINAÇÃO UFC: UNIDADES FORMADORAS DE COLÓNIAS ADJUVANTE: ÓLEO MINERAL 874,65 MG EXCIPIENTES: TIOMERSAL 0,200 MG
PORCILIS BEGÓNIA DF LIOFILIZADO E SOLVENTE PARA SUSPENSÃO PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR PARA SUÍNOS.	458/92 DGV	MSD ANIMAL HEALTH, LDA.	IMUNIZAÇÃO ATIVA DE PORCOS CONTRA A DOENÇA DE AUJESZKY (PSEUDORAIVA) PARA PREVENÇÃO DA MORTALIDADE E SINAIS CLÍNICOS ASSIM COMO, PARA A REDUÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DO VÍRUS DA DOENÇA DE AUJESZKY. INÍCIO DA IMUNIDADE: 3 SEMANAS DURAÇÃO DA IMUNIDADE: APROXIMADAMENTE 4 MESES	SUINOS	VIVA C/DILUENTE AQUOSO/OLEOSO	LIOFILIZADO E SOLVENTE PARA SUSPENSÃO PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR.	SUBSTÂNCIAS ATIVAS: VÍRUS VIVO DA DOENÇA DE AUJESZKY ESTIRPE BEGÓNIA (GE-, TK-): 105,5 - 106,5 DICT50* POR DOSE DE 2 ML. SOLVENTE PARA A VACINA PORCILIS BEGÓNIA DF: ADJUVANTE: DL--ACETATO DE TOCOFEROL: 75,0 MG/ML EXCIPIENTES: PARA A LISTA COMPLETA DE EXCIPIENTES, VER SECÇÃO 6.1. * DICT50: DOSE INFECCIOSA CULTURA DE TECIDOS 50%
PORCILIS BEGÓNIA IDAL			IMUNIZAÇÃO ATIVA DE PORCOS CONTRA A DOENÇA DE AUJESZKY (PSEUDORAIVA) PARA PREVENÇÃO DA MORTALIDADE E SINAIS CLÍNICOS, ASSIM COMO, PARA A REDUÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DO VÍRUS DA	SUINOS	VIVA	LIOFILIZADO E SOLVENTE PARA SUSPENSÃO PARA INJEÇÃO INTRADÉRMICA	SUBSTÂNCIAS ATIVAS: VÍRUS VIVO DA DOENÇA DE AUJESZKY ESTIRPE BEGÓNIA (GE-, TK-): 105,5 - 106,5 DICT50 POR DOSE DE 0,2 ML. SOLVENTE PARA A VACINA PORCILIS BEGÓNIA IDAL: ADJUVANTE: dl-α-Acetato DE TOCOFEROL:

PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE AUJESZKY (PCEDA) VACINAS AUTORIZADAS PARA A DOENÇA DE AUJESZKY DECRETO-LEI N.º 85/2012 de 5 de abril alterado pelo DECRETO-LEI N.º 222/2012 de 15 outubro

NOME	Nº DA AIM	TITULAR AIM	INDICAÇÕES	ESPECIES	TIPO DE VACINA	FORMA FARMACÊUTICA	COMPOSIÇÃO
LIOFILIZADO E SOLVENTE PARA SUSPENSÃO PARA INJEÇÃO INTRADÉRMICA EM SUÍNOS	546/95 DGV	MSD ANIMAL HEALTH, LDA.	DOENÇA DE AUJESZKY. INÍCIO DA IMUNIDADE: 3 SEMANAS DURAÇÃO DA IMUNIDADE: APROXIMADAMENTE 4 MESES		C/ SOLVENTE AQUOSO/OLEOSO		75,0 MG/ML EXCIPIENTES LIOFILIZADO: MEIO DE CULTURA, ESTABILIZADOR QUIMICAMENTE DEFINIDO CD#156 (PATENTEADO) SOLVENTE PARA A VACINA PORCILIS BEGONIA IDAL: POLISSORBATO 80, SIMETICONE, CLORETO DE SÓDIO, TAMPÕES DE FOSFATO DE POTÁSSIO E SÓDIO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS.
PORCILIS BEGÓNIA UNISOLVE	391/91DGV	MSD ANIMAL HEALTH, LDA.	IMUNIZAÇÃO ATIVA DE PORCOS CONTRA A DOENÇA DE AUJESZKY (PSEUDORAIVA) PARA PREVENÇÃO DA MORTALIDADE E SINAIS CLÍNICOS, ASSIM COMO PARA A REDUÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DO VÍRUS DA DOENÇA DE AUJESZKY. INÍCIO DA IMUNIDADE: 3 SEMANAS DURAÇÃO DA IMUNIDADE: APROXIMADAMENTE 4 MESES	SUINOS	VIVA C/ SOLVENTE AQUOSO	LIOFILIZADO E SOLVENTE, PARA SUSPENSÃO PARA INJEÇÃO INTRAMUSCULAR.	SUBSTÂNCIA ATIVA: VÍRUS VIVO DA DOENÇA DE AUJESZKY ESTIRPE BEGONIA (GE-, TK-): 105.5 - 106.5 DICT50 POR DOSE DE 2 ML. *DICT 50: DOSE INFECIOSA CULTURA DE TECIDOS 50% SOLVENTE PARA A VACINA PORCILIS BEGÓNIA UNISOLVE EXCIPIENTES LIOFILIZADO: MEIO DE CULTURA MEIO ESTABILIZADOR QUIMICAMENTE DEFINIDO CD#156 (PATENTEADO) SOLVENTE PARA A VACINA PORCILIS BEGÓNIA UNISOLVE: CLORETO DE SÓDIO TAMPÕES DE POTÁSSIO E FOSFATO DE SÓDIO TAMPÃO SACAROSE ÁGUA PARA INJETÁVEIS.
SUVAXYN AUJESZKY 783+O/W	638/99 DGV	ZOETIS BELGIUM SA	IMUNIZAÇÃO ACTIVA DE SUÍNOS A PARTIR DAS 10 SEMANAS DE IDADE PARA PREVENIR A MORTALIDADE E SINAIS CLÍNICOS DA DOENÇA DE AUJESZKY E REDUZIR A EXCREÇÃO DO VÍRUS DE CAMPO DA DOENÇA DE AUJESZKY. IMUNIZAÇÃO PASSIVA DA DESCENDÊNCIA DE MARRÁS E	SUÍNOS	VIVA	PÓ E SOLVENTE PARA	SUBSTÂNCIA (S) ACTIVA (S): VÍRUS VIVO ATENUADO DA DOENÇA DE AUJESZKY, ESTIRPE NIA3-783: ≥ 105,2 DICC50* POR DOSE DE 2 ML DE EMULSÃO RECONSTITUÍDA. * DICC50 = QUANTIDADE DE VÍRUS QUE INFECTA 50 % DA CULTURA DE CÉLULAS INOCULADA. SOLVENTE: UMA DOSE DE 2 ML CONTÉM

PLANO DE CONTROLO E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE AUJESZKY (PCEDA) VACINAS AUTORIZADAS PARA A DOENÇA DE AUJESZKY DECRETO-LEI N.º 85/2012 de 5 de abril alterado pelo DECRETO-LEI N.º 222/2012 de 15 outubro

NOME	Nº DA AIM	TITULAR AIM	INDICAÇÕES	ESPECIES	TIPO DE VACINA	FORMA FARMACÊUTICA	COMPOSIÇÃO
			PORCAS VACINADAS PARA REDUZIR A MORTALIDADE E SINAIS CLÍNICOS DA DOENÇA DE AUJESZKY E, PARA REDUZIR A EXCREÇÃO DO VÍRUS DE CAMPO DA DOENÇA DE AUJESZKY. IMUNIDADE ACTIVA: O INÍCIO DA IMUNIDADE REGISTA-SE 3 SEMANAS A CONTAR DA VACINAÇÃO PRIMÁRIA. A IMUNIDADE MANTÉM-SE POR UM PERÍODO DE 3 MESES A CONTAR DE VACINAÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA.		C/DILUENTE AQUOSO/OLEOSO	EMULSÃO INJECTÁVEL	ADJUVANTE(S): HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 2,1 MG ÓLEO MINERAL (MARCOL 52) 425 ML MONOLEATO DE MANIDE (ARLACEL A) 46 ML POLISSORBATO 80 (TWEEN 80) 17 ML EXCIPIENTE(S) TIOMERSAL 0,15 MG
SUVAXYN AUJESZKY IN/IM	617/98 DGV	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	IMUNIZAÇÃO ATIVA PARA PREVENÇÃO DA MORTALIDADE E DOS SINAIS CLÍNICOS DA DOENÇA DE AUJESZKY. A IMUNIDADE ESTABELECE-SE UMA SEMANA APÓS VACINAÇÃO E TEM UMA DURAÇÃO DE PELO MENOS 12-13 SEMANAS.	SUÍNOS A PARTIR DAS 10 SEMANAS DE IDADE.	VIVA C/DILUENTE AQUOSO	LIOFILIZADO E DILUENTE PARA SUSPENSÃO INJECTÁVEL.	SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S): VÍRUS VIVO DA DOENÇA DE AUJESZKY, ESTIRPE BARTHA K61 \geq 105,2 DIC50* *O TÍTULO DADO É O TÍTULO GARANTIDO NO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE. NA LIBERTAÇÃO UMA DOSE DE VACINA CONTÉM 105,8-106,8 DIC50 DILUENTE: A COMPOSIÇÃO DO DILUENTE, POR DOSE DE 2 ML, É A SEGUINTE: HIDROGENOFOSFATO DISSÓDICO.2AQ 38,00 MG DIHIDROGENOFOSFATO DE POTÁSSIO 5,00 MG FENOLSULFOFTALEÍNA 4,00 MG ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.P.B. 2,00 ML EXCIPIENTES D-MANITOL INOSITOL PEPTONA GELATINA