

Outubro 2021

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Eurican DAPPi-LR liofilizado e suspensão para suspensão injetável	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal, Unipessoal, Lda.	<b>Cães:</b> 1 ano	<b>Primovacinação:</b> Uma injeção da vacina a partir das 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> Anual.
Nobivac Rabies, suspensão injetável destinada a cães, gatos, bovinos e equinos	MSD Animal Health, Lda.	<b>Cães e gatos:</b> 3 anos	<b>Primovacinação:</b> Primovacinação em idade superior a 12 semanas <i>* A primovacinação pode ser administrada mais cedo, mas deve ser administrada uma revacinação às 12 semanas ou 6 meses, dependendo da espécie</i>  <b>Revacinação:</b> 3 anos.
Purevax Rabies suspensão injetável (Vacina para Gatos)	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	<b>Gatos:</b> 1 ano após a primovacinação; depois de 3 em 3 anos.	<b>Primovacinação:</b> Às 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> 1 ano após a primovacinação e depois de 3 em 3 anos.

Outubro 2021

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
RABISIN Suspensão injetável	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal, Unipessoal, Lda.	<b>Cães e gatos:</b> 1 ano após a primovacinação e depois de 3 em 3 anos <b>Mustelídeos:</b> 1 ano	<b>Cães e gatos:</b> <b>Primovacinação:</b> A partir das 12 semanas de idade. <b>Revacinação:</b> 1 ano após a primovacinação. No caso desta revacinação ser feita com a Rabisin, a partir daí, de 3 em 3 anos no máximo. <b>Mustelídeos:</b> <b>Primovacinação:</b> A partir dos 3 meses de idade. <b>Revacinação:</b> Anual
RABIGEN MONO Solução injetável para cães e gatos	VIRBAC SA (França)	<b>Cães e Gatos:</b> 1 ano após a primovacinação; depois de 3 em 3 anos.	<b>Primovacinação:</b> Uma única administração a partir dos 3 meses. <b>Revacinação</b> Uma injeção de reforço de uma dose única de Rabigen Mono deve ser administrada um ano após a vacinação primária. Posteriormente, para cães e gatos, as vacinas são realizadas em intervalos de 3 anos.
Vacina Antirrábica, suspensão injetável para cães, gatos e bovinos	Medinfar-sorológico – Produtos e equipamento S.A.	<b>Cães e Gatos:</b> 1 ano	<b>Primovacinação:</b> Administrar uma dose de vacina a partir da 12ª semana de vida. <b>Revacinação:</b> Anual.

Outubro 2021

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Versican DHPPi/L3R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	<b>Cães:</b> 1 ano	<b>Primovacinação:</b> A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada após uma dose única a partir das 12 semanas de idade.  <b>Revacinação:</b> Anual.
Versican Plus DHPPi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS BELGIUM SA	<b>Cães:</b> 3 anos	<b>Primovacinação:</b> A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não fizeram seroconversão ( $> 0,1$ UI/ml) 3-4 semanas após vacinação primária única contra a raiva. Alguns animais podem também não apresentar um título de anticorpos $> 0,5$ UI/ml após primovacinação única. O título de anticorpos diminui ao longo dos 3 anos de duração de imunidade, embora os cães estejam protegidos se infetados. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico veterinário pode optar por administrar vacinação antirrábica adicional após as 12 semanas para assegurar que os animais vacinados têm um título de anticorpos $\geq 0,5$ UI/ml, que é normalmente considerado como suficientemente protetor e assim cumprir os requisitos para os animais viajarem (título de anticorpos $\geq 0,5$ UI/ml).  <b>Revacinação:</b> Revacinação de 3 em 3 anos.

Outubro 2021

**LISTAGEM VACINAS ANTIRÁBICAS AUTORIZADAS PARA CÃES, GATOS E FURÕES**

NOME	TITULAR AIM	DURAÇÃO DA IMUNIDADE	PROTOCOLO VACINAL
Versican Plus Pi/L4R, liofilizado e solvente para suspensão injetável para cães	ZOETIS BELGIUM SA	<b>Cães:</b> 3 anos	<b>Primovacinação:</b> A eficácia da valência contra a raiva foi comprovada em estudos laboratoriais após uma dose única a partir das 12 semanas de idade. No entanto, em estudos de campo, 10% dos cães seronegativos não demonstraram seroconversão (> 0,1 UI/ml) 3-4 semanas após uma administração primária única contra a raiva. Outros 17% não apresentaram um título de anticorpos contra a raiva de 0,5 UI/ml, que é requerido por alguns países fora da UE para a entrada de animais. No caso dos animais viajarem para áreas de risco ou para fora dos países da UE, o médico veterinário pode optar por efetuar a primovacinação com duas doses que incluam a raiva, ou pode administrar uma vacinação antirrábica adicional após as 12 semanas.  <b>Revacinação:</b> Revacinação de 3 em 3 anos
Versiguard Rabies	ZOETIS PORTUGAL, LDA.	<b>Cães:</b> 3 anos  <b>Gatos e Furões:</b> 1 ano após a primovacinação; depois 2 anos	<b>Primovacinação:</b> A partir das 12 semanas de idade. A primovacinação é com uma dose única da vacina.  <b>Revacinação:</b> <b>Cães:</b> 3 anos  <b>Gatos e Furões:</b> 1 ano após a primovacinação; depois 2 anos