

Diagnóstico

- Em caso de suspeita, colher amostras das colónias suspeitas e enviar para o laboratório para confirmação do diagnóstico;
- Fazer análises anuais ao apiário.



Proflaxia

- Medidas gerais de higiene da colmeia;
- Desinfecção do material apícola;
- Substituição periódica de ceras;
- Limpeza regular de estrados;
- Introdução controlada de material e produtos apícolas;
- Substituição de rainhas com mais de dois anos.

Atenção

É Proibido entrada/saída de Portugal e Entrada em zonas controladas de Portugal



Atenção

Em caso de suspeita deve ser comunicado, de imediato às Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais (DSAVR) da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)

Contatos

DSAVR Norte	253 783 013/16 dsavrn@dgav.pt
DSAVR Centro	271 025 214/17 dsavrc@dgav.pt
DSAVR Lisboa e Vale do Tejo	263 146 800/820 secretariado.lvt@dgav.pt
DSAVR Alentejo	266 730 580/90 secretariado_dsvralentejo@dgav.pt
DSAVR Algarve	289 870 700 289 093 595 dsavr.algarve@dgav.pt
RA Açores (DRAg)	295 404 200 295 216 359 info.drdr@azores.gov.pt
RA Madeira (DRA)	291 145 465 dsdp.dra.sra@madeira.gov.pt

Ficha Técnica

Edição DGAV: nov. 2024

Fotografias: www.pixabay.com • www.anses.fr • www.mapa.gob.es • www.ipmimages.org

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande, nº 50 | 1700-093 Lisboa
213 239 500 | geral@dgav.pt | www.dgav.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA

AGRICULTURA E PISCAS



Loque Americana e Loque Europeia

*Bactéria Paenibacillus larvae
e Melissococcus plutonius*



dgav
Direção Geral
de Alimentação
e Veterinária

**Direção de Serviços
de Proteção Animal**

Divisão de Epidemiologia
e Saúde Animal

Loque Americana

Doença de declaração obrigatória


(Decreto-lei nº 203/2005, de 25/11)

A loque americana é uma doença da criação. É causada pela bactéria *Paenibacillus larvae*. Trata-se de uma bactéria com capacidade de esporulação sendo que os esporos são muito resistentes aos meios físicos e químicos, podendo sobreviver durante vários anos.





Sinais Clínicos

- Criação "manchada"/em mosaico/dispersa;
- Larvas viscosas, filantes (teste do palito);
- Odor característico tipo cola de sapateiro;
- Opérculos escurecidos, deprimidos e perfurados;
- Larvas de cor acastanhada.




Identificar sinais clínicos da infestação

Loque Americana



Loque Europeia



Loque Europeia

Doença de declaração obrigatória

(Decreto-lei nº 203/2005, de 25/11)

Não existe em Portugal

A loque europeia é uma doença da criação. É causada pela bactéria *Melissococcus plutonius*. Outros agentes secundários como o *Paenibacillus alvei* e *Enterococcus faecalis* estão frequentemente.



Sinais Clínicos

- Criação "manchada"/em mosaico/dispersa;
- Larvas afundadas;
- Larvas de cor amarelada a acastanhada;
- Opérculos perfurados;
- Odor acre (tipo vinagre) ou putrefação das larvas.

